

# 「普拉比拉芬」農藥使用方法及其範圍

中華民國 114 年 3 月 14 日農授防字第 1141875452A 號公告

## 一、新農藥普通名稱一覽表

| 普通名稱  | 英文普通名稱                                      | IUPAC/有效成分                                                                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 普拉比拉芬 | pretilachlor +<br>florpyrauxifen-<br>benzyl | (1) 2-chloro-2',6'-diethyl-N-(2-propoxyethyl)acetanilide<br>(2) benzyl 4-amino-3-chloro-6-(4-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl)-5-fluoropyridine-2-carboxylate |

## 二、「普拉比拉芬」農藥使用方法與範圍一覽表

310 g/L (31% w/v) 普拉比拉芬 水基乳劑(EW)

| 作物<br>名稱 | 病蟲<br>名稱 | 每公頃<br>每次用<br>量 | 稀釋<br>倍數             | 使用時期                                                                                    | 施藥<br>間隔<br>(天) | 施藥<br>次數 | 施藥<br>方法 | 安全<br>採收<br>期(天) | 注意事項                                                                                            | 說明                                                         |
|----------|----------|-----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 水稻       | 雜草       | 2 公升            | 稀釋<br>至<br>300<br>公升 | 插秧後 5-12<br>天或雜草小<br>於 4 葉時均<br>勻噴施於田<br>區。施藥前<br>排水，施藥<br>後保持積水<br>3-7 天，水深<br>3-5 公分。 |                 |          |          |                  | 1. 防除水稻移植<br>本田雜草。<br>2. 防除對象：稗<br>草、球花蒿草、<br>碎米莎草、尖<br>瓣花、母草。<br>3. 依使用方法用<br>藥，無需訂定<br>安全採收期。 | 原 始<br>登 記<br>廠 商<br>名 稱：<br>台 灣<br>正 股<br>份 有<br>限 公<br>司 |